

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

일반의약품 품목기준코드 : 201603141 기미 치료제
첨부문서 작성일자 : 2024년 01월 12일



TRANSINO®
트란시노2정
트라넥삼산 배합

특징

트란시노2정은 트라넥삼산을 기미개선 성분으로 배합한 1회 2정, 1일 2회 복용의 의약품입니다.

원료약품 및 그 분량

1정 중

유효성분	함량
트라넥삼산 (JP)	187.5mg
아스코르브산 (JP)	75mg
L-시스테인 (JP)	60mg
판토텐산칼슘 타입 S (별규)(판토텐산칼슘으로서 6mg)	9.25mg
피리독신염산염 (JP)	1.5mg

첨가제

마크로골6000, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 삼이산화철, 스테아르산마그네슘, 카르나우바납, 크로스카르멜로오스나트륨, 탈크, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

성상

흰색 혹은 연한 적백색을 띠는 원형의 필름코팅정

*날알식별표시

표시(앞)	표시(뒤)
TS2	

효능·효과

기미

용법·용량

다음의 양을 물과 함께 복용하세요.

연령	1회 복용량	1일 복용횟수
15세 이상	2정  	1일 2회 식후에 복용하십시오.
15세 미만	복용하지 마십시오.	

<용법·용량에 관한 주의>

- 용법·용량을 엄수하여 주시기 바랍니다.
- 정제를 꺼내는 방법 : 오른쪽 그림과 같이 정제에 들어가있는 PTP시트의 볼록 튀어나온 부분을 손끝으로 강하게 눌러 뒷면의 알루미늄호일을 찢고 꺼내어 복용하여 주십시오. (잘못하여 그대로 복용하거나 하면, 식도점막이 찢어지는 등 생각치 못한 사고로 이어지게 됩니다.)



포장단위

120정 [60정(6정/PTP × 10) × 2]

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 트라넥삼산을 함유하는 내복약을 복용하고 있는 사람
- 트롬빈을 투여 중인 사람
- 중증[심한증상] 신[신장]장애 및 간성혼수가 있는 사람
(투석요법을 받고 있는 사람이 이 약을 복용할 경우 경련이 나타날 수 있습니다.)
- 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 사람
- 혈전[혈관막힘]증이 있는 사람(뇌혈전[혈관막힘], 심근경색, 혈전[혈관막힘]성정맥염, 폐색전증 등)

- 4 -