수직 정렬하는 제품의 특징적인 형태를 나타내고, 이한 특성 변경시는 정제의 부피가 "연결되어져" 될 확률 확률을 나타냄.

벨킨 ※ 3.5 mg (비선택적 칼슘채널)

제품명 및 그 분류	벨킨
유효 성분 : 비선택적 칼슘채널차단제	3.3mg (비선택적칼슘채널 3.5mg)
첨가제(첨가물) 그 전 내용	35mg

[효능 및 효과] 경증 및 중등증의 본태성 고혈압에 대한 단독 및 병용요법

[용법 및 용량]

1. 단독 요법
   1) 권장용량은 1일 1회 1정이다. 1일 최대 2정까지 1회 1정을 경우에 대한 정량이 초과되는 경우에는 다음 2)를 참조하시기 바랍니다.
   2) 충분한 혈압조절이 되지 않는 경우에는 1일 1회 1정을 유지하면서 1일 최대 2정까지 1회 2정을 복용하시기 바랍니다.
   3) 연령 및 체중에 따른 용량 조절 : 없음
   4) 간기능 장애 환자에 대한 용법 : 없음
2. 병용요법(칼슘채널차단제 이외의 약물)
   1) 1일 1회 1정 복용하시기 바랍니다. 1일 최대 2정까지 1회 1정을 복용하시기 바랍니다.
   2) 연령 및 체중에 따른 용량 조절 : 없음
   3) 간기능 장애 환자에 대한 용법 : 없음

[용법 정제]

8				7				6				5				4
피부전도 (3.5mg/정)																
혈압강하 (35mg/정)	정	정	정	정	정	정	정	정	정	정	정	정	정	정	정	정
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

4				3				2				1
피부전도 (3.5mg/정)												
혈압강하 (35mg/정)	정	정	정	정	정	정	정	정	정	정	정	정
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

[중증 정제]

최초 중증을 정제하는 경우 : 1일 1회 1정을 복용하시기 바랍니다. 1일 최대 2정까지 1회 1정을 복용하시기 바랍니다.

1. 칼슘채널차단제 이외의 약물 : 1일 1회 1정을 복용하시기 바랍니다. 1일 최대 2정까지 1회 1정을 복용하시기 바랍니다.
   1) 1일 1회 1정 복용하시기 바랍니다. 1일 최대 2정까지 1회 1정을 복용하시기 바랍니다.
   2) 연령 및 체중에 따른 용량 조절 : 없음
   3